



Universität Hamburg

DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

Lineare Algebra I

Wintersemester 25/26

Prof. Dr. C. Schweigert,

Dr. T. Zorman

Algebra und Zahlentheorie

Fachbereich Mathematik

Universität Hamburg

## Blatt 1

Zur Abgabe am Montag, dem 20.10.25. Die Abgabe wird über moodle geschehen.

### Problem 1.1 [1 + 2 Punkte]

Seien  $a, b \in \mathbb{Q}$  rationale Zahlen.

- Betrachten Sie die Gleichung  $ax = 0$ . Hat diese Gleichung immer mindestens eine reelle Lösung für  $x$ ? Beschreiben Sie den Lösungsraum in Abhängigkeit von  $a$ .
- Betrachten Sie die Gleichung  $ax = b$ . Beschreiben Sie den Raum der rationalen und der reellen Lösungen dieser Gleichung in Abhängigkeit von  $a$  und  $b$ .

(Alle Antworten müssen begründet werden.)

### Problem 1.2 [3 Punkte]

Für gegebene rationale Zahlen  $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, b_1$  und  $b_2$  betrachten wir das System linearer Gleichungen

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= b_2\end{aligned}$$

in den Unbekannten  $x_1, x_2$ .

- Geben Sie einen Wert für  $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, b_1$  und  $b_2$  an, für den keine Lösungen für  $x_1, x_2$  in den rationalen Zahlen existieren.
- Geben Sie einen Wert für  $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, b_1$  und  $b_2$  an, für den unendlich viele Lösungen für  $x_1, x_2$  in den rationalen Zahlen existieren.
- Geben Sie einen Wert für  $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, b_1$  und  $b_2$  an, für den unendlich viele rationale Lösungen für  $x_1, x_2$  existieren, aber nicht alle  $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$  Lösungen sind. Formulieren Sie eine Vermutung über die Geometrie des Lösungsraums.

(Alle Antworten müssen begründet werden.)

**Problem 1.3** [4 Punkte + 4 Bonuspunkte]


Wir betrachten wie in der Präsenzübung die zwei Abbildungen

$$A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ -x_1 - 3x_2 \end{pmatrix}, \quad B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x_1 + 4x_2 \\ 3x_1 + 6x_2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Es sei  $p = (1, \frac{3}{2})$  und  $q = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ . Welche Elemente  $x \in \mathbb{R}^2$  werden von  $A$  auf  $q$  abgebildet? Welche von  $B$ ?
- (b) Bilden die Abbildungen  $A$  und  $B$  die Gerade  $G_{p,v}$  mit Fußpunkt  $p$  und Richtungsvektor  $v = (-2, 1)$  wieder auf eine Gerade im  $\mathbb{R}^2$  ab?

**Problem 1.4** [1 + 1 + 2 Punkte]

- (a) Ordnen Sie den folgenden Graphen die entsprechende Beschreibung der Gerade in Parameter- und Gleichungsform zu. Die Antwort muss nicht begründet werden.



- (b) Geben Sie eine Gleichung an, die die  $xy$ -Ebene im  $\mathbb{R}^3$  beschreibt.
- (c) Geben Sie eine Gleichung an, die die Ebene im  $\mathbb{R}^3$  beschreibt, die die  $xy$ -Ebene senkrecht in der Winkelhalbierenden zwischen der  $x$ -Achse und  $y$ -Achse schneidet.

*Jeder Zettel wird einen Umfang von ca. 20 Punkten haben. Die Verteilung der Punkte auf die einzelnen Aufgaben sagt nur bedingt etwas über den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben aus.*